

POUR LA SUPPRESSION DE LA TORDEUSE ORIENTALE DU PÊCHER
PHÉROMONE DE CONFUSION SEXUELLE ISOMATE®-M 100
POUR UTILISATION SUR LES PÊCHERS, LES BRUGNONIERS, LES ABRICOTIERS,
LES POMMIERS ET LES POIRIERS

AGRICOLE

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

GARANTIE:	ACÉTATE DE (Z)-DODEC-8-ÉNYLE	88,54 %
	ACÉTATE DE (E)-DODEC-8-ÉNYLE	5,68 %
	(Z)-8-DODECÈN-1-OL	0,99 %

NUMÉRO D'ENREGISTREMENT 26981 - LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

CONTENU NET: 400 diffuseurs par paquet (chaque diffuseur contient 243.8 mg
de phéromone pour un total de 97.5 g de phéromone par paquet)

PACIFIC BIOCONTROL CORPORATION

14615 NE 13th Court, Suite A, Vancouver, Washington 98685 USA
Téléphone : 360-571-2247

MODE D'EMPLOI

**IL EST TRÈS IMPORTANT QUE LA PHÉROMONE DE CONFUSION SEXUELLE
ISOMATE-M 100 SOIT APPLIQUÉE TEL QU'INDIQUÉ**

Les producteurs utilisant ce produit doivent maintenir des registres détaillés des dommages encourus à l'intérieur de leur verger. Il est important d'enlever et de détruire tous les fruits infestés sur les arbres et au sol. Le dépistage précis des populations adultes est essentiel puisque le mode d'utilisation de la PHÉROMONE DE CONFUSION SEXUELLE ISOMATE-M 100 est très différente du mode d'utilisation des insecticides conventionnels à large spectre homologué pour le contrôle de la tordeuse orientale du pêcher. La réussite du programme de lutte avec PHÉROMONE DE CONFUSION SEXUELLE ISOMATE-M 100 dépend de la discussion continue avec les experts en lutte intégrée les conseillers horticoles et les représentants des compagnies de produits antiparasitaires.

CULTURES: Pêche, brugnion (nectarine), abricot, pomme et poire.

PARASITE: Tordeuse orientale du pêcher (*Grapholita molesta*).

DOSE D'EMPLOI: Un minimum de 250 diffuseurs à l'hectare (100 diffuseurs à l'acre). Attacher un diffuseur par arbre. Un maximum de 375 diffuseurs à l'hectare (150 diffuseurs à l'acre).

APPLICATION: Attacher solidement le diffuseur sur une branche latérale dans le tiers supérieur de l'arbre, de préférence à 0,7-1 mètre de la cime. Les diffuseurs attachés trop serrés peuvent provoquer des plaies d'étranglement. Ils peuvent être installés efficacement à l'aide d'une remorque en mouvement ou d'une perche conçue à cet effet.

PÉRIODE D'UTILISATION: Installer les diffuseurs avant l'émergence des papillons adultes au printemps. Les diffuseurs libèrent de la phéromone pendant une période allant jusqu'à 90 jours dépendamment de la température. Dans les cultures où la période de vol des tordeuses s'étend sur plus de 90 jours ou en cas de forte infestation, une deuxième application est recommandée. Si plus d'une application est nécessaire, appliquer avant le début de l'émergence de la prochaine génération. Dans les cultures attaquées par la tordeuse orientale du pêcher tard dans la saison, tel le poirier, la PHÉROMONE DE CONFUSION SEXUELLE ISOMATE-M 100 n'empêchera pas les dégâts causés par des femelles fécondées venant de l'extérieur. Le traitement de ces blocs est recommandé lorsque ces cultures sont à l'intérieur ou près des blocs traités avec la PHÉROMONE DE CONFUSION SEXUELLE ISOMATE-M 100. Consulter votre conseiller horticole local ou un consultant en production fruitière qualifié pour déterminer la période d'application.

NOTE: PHÉROMONE DE CONFUSION SEXUELLE ISOMATE-M 100 prévient l'accouplement de la tordeuse orientale du pêcher. Toutefois, si un grand nombre de femelles déjà fécondées de la même espèce sont présentes aux alentours du verger traité, le déplacement de ces femelles réduira le niveau de contrôle obtenu. Les espèces ôte non-traités dans un rayon de 300 mètres peuvent servir de sources de contamination pour le verger traité. Les mesures à prendre pour contrer ce problème sont les suivantes :

- Traitement de vergers entiers et non seulement des parties de grands blocs traités de façon conventionnelle qui servent souvent de sources de contamination de femelles fécondées.
- Traitement des vergers représentant des sources de contamination avec la PHÉROMONE DE CONFUSION SEXUELLE ISOMATE-M 100 (par exemple, traiter une bande d'au moins 50 mètres adjacents au verger traité).
- Traitement des vergers représentant des sources de contamination avec un insecticide efficace.
- Traitement de 4 à 6 rangs en bordure des vergers traités avec les phéromones avec des applications d'insecticides.

Des applications d'insecticides supplémentaires sont recommandées lorsque la PHÉROMONE DE CONFUSION SEXUELLE ISOMATE-M 100 est utilisée pour le contrôle d'une forte population de tordeuses orientales du pêcher. Tous les insectes nuisibles doivent être suivis de façon à ce que des applications d'insecticides conventionnels bien synchronisées soient possibles.

ISOMATE® est une marque déposée de "Pacific Biocontrol Corporation".

PRÉCAUTIONS:**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**

N'ouvrir les enveloppes de feuille d'argent que lorsque prêt à utiliser. Éviter de respirer les vapeurs et éviter tout contact avec des substances liquides. Nocif si avalé. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Pendant la manipulation du produit, porter des gants et des lunettes de protection résistant aux produits chimiques. Se laver les mains avec de l'eau et du savon après l'utilisation du produit.

Ne pas contaminer l'eau d'irrigation, les lacs, les ruisseaux et les étangs lors de l'élimination.

PREMIERS SOINS:

CONTACT AVEC LA PEAU: Laver avec de l'eau et du savon.

CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer immédiatement à grande eau. Consulter un médecin si l'irritation persiste.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'enregistrement lorsqu'on cherche à obtenir une attention médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:

Traiter selon les symptômes.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION

Éviter la contamination des produits destinés à la consommation humaine et animale lors de l'entreposage ou l'élimination des diffuseurs utilisés ou non.

Ne pas jeter les diffuseurs, utilisés ou non, dans ou près des étendues d'eau.

ENTREPOSAGE: Entreposer les paquets de diffuseurs non-ouverts à une température inférieure à 4°C dans un endroit sec.

ÉLIMINATION: Les diffuseurs inutilisés qui ne peuvent pas être appliqués selon le mode d'emploi doivent être mis au rebut selon la réglementation provinciale en vigueur.

ÉLIMINATION DES RÉCIPIENTS: Les diffuseurs usagés et les enveloppes de feuille d'argent doivent être mis au rebut selon la réglementation provinciale en vigueur.

GÉNÉRAL: Pour plus d'information sur la mise au rebut de produits inutilisés ou superflus, veuillez vous adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial approprié. Communiquer avec le fabricant et l'organisme de réglementation provincial approprié en cas de déversement et pour le nettoyage des déversements.

AVIS À L'UTILISATEUR: Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))